

ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ОБОСТРЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИЛИ СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ СИМПТОМОВ(ТРИГГЕРЫ).

Факторы, которые вызывают обострение бронхиальной астмы



Аллергены,

-Респираторные инфекции - респираторные вирусы повреждают мерцательный эпителий слизистой оболочки дыхательных путей, увеличивают её проницаемость для аллергенов и чувствительность ирритантных рецепторов подслизистого слоя бронхов. Тем самым они повышают бронхиальную гиперактивность.

-Физическая нагрузка,

-Изменения погоды,

-Пища,

-Чрезмерные эмоциональные нагрузки.

-Прием лекарственных препаратов – ведущее место занимают антибиотики, особенно пенициллинового ряда, сульфаниламиды, ацетилсалициловая кислота и др.

-Вакцины (особенно АКДС) – могут явиться пусковым фактором манифестации бронхиальной астмы.

-Нестероидные противовоспалительные препараты. У некоторых больных приём НПВП вызывает удушье. Если непереносимость аспирина сочетается с рецидивирующими синуситами и полипозом носа, то говорят об астматической триаде. У этих больных можно наблюдать крапивницу, отёк Квинке, пищевую непереносимость, но поиски специфических антител.

ТРИГГЕРЫ АСТМЫ



ПОГОДА



ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ
ВЕЩЕСТВА В ВОЗДУХЕ



ПЛЕСЕНЬ, ГРИБЫ,
ПЫЛЬЦА



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ



ПРОСТУДА И
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ



ФИЗИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ



ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА




ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ



ДОМАШНИЕ
ПЫЛЕВЫЕ КЛЕЩИ



ПАРФЮМ



ЖИВОТНЫЕ