

## **Временная маршрутизация для пациентов старше 18 лет, страдающих рассеянным склерозом на территории Республики Крым в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19**

1. Пациенты с РС для предупреждения инфицирования, должны строго соблюдать режим самоизоляции в связи с высоким риском обострений РС на фоне вирусной инфекции.

2. В случае необходимости визитов пациентов, которые состоят на учете в кабинете рассеянного склероза ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»:

2.1. Визиты осуществляются очно или заочно (в телефонном и онлайн-режиме: viber, whatsapp +79788402511);

2.2. очная консультация проводится исключительно в случае экстренной необходимости (при подозрении на обострение заболевания);

2.3. дни и время приема остаются прежними;

2.4. пациенты, получающие инфузии моноклональных антител (натализумаб, алемтузумаб) госпитализируются согласно запланированной ранее схеме терапии;

2.5. информация для пациентов представлена в полном объеме в социальных интернет-группах для пациентов с рассеянным склерозом Республики Крым (viber, whatsapp +79788402511).

3. Обеспечение препаратами ПИТРС в апреле 2020 г. будет осуществлено на 3 месяца (апрель, май, июнь), вновь выявленным пациентам терапия ПИТРС будет инициирована в индивидуальном порядке. Выписка рецептов препаратов ПИТРС осуществляется врачами амбулаторно – поликлинической службы - на 3 месяца с доставкой на дом (в случае необходимости).

### **НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:**

- Люди с заболеваниями легких и сердца, а также те, кто старше 60 лет, более склонны испытывать осложнения и тяжело переносить коронавирусную инфекцию COVID-19. К этой группе также относятся пациенты с РС, особенно те, у кого есть сопутствующие заболевания, ограничение подвижности или те, кто получает некоторые ПИТРС.
- Пациенты с РС должны уделять особое внимание актуальным рекомендациям по снижению риска заражения COVID-19, разработанных Росздравнадзором и Министерством здравоохранения РФ, включая дополнительные рекомендации для людей, подверженных риску серьезных осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19.
- Члены семьи, которые проживают совместно с пациентом с РС, или люди, осуществляющие за ним уход на периодической основе, также должны следовать этим рекомендациям, чтобы уменьшить вероятность занесения инфекции COVID-19 в дом.
- Пациенты с РС, начинающие терапию ПИТРС, должны обсудить все риски начала терапии со своим лечащим врачом.
- Пациенты с РС, получающие терапию ПИТРС, должны обсудить риски прекращения терапии со своим лечащим врачом до принятия решения о ее прекращении.
- Пациенты с РС, которым планируется смена терапии ПИТРС в связи с неэффективностью, должны быть предупреждены обо всех рисках новой терапии, рисках активности заболевания и возможных сроках начала новой терапии ПИТРС (в случае ПИТРС 2-ой линии).