

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

ПОСЛЕДСТВИЯ ИППП



Малосимптомное течение заболевания приводит к поздней диагностике ИППП и, как следствие, к развитию **осложнений**:

1. **Воспалению органов** репродуктивной системы (как у мужчин, так и у женщин), а в дальнейшем к бесплодию.
2. **Развитию неопластических процессов** — раку шейки матки и другим онкологическим заболеваниям.
3. **Негативному влиянию на течение беременности и развитие плода** — внематочной беременности, выкидышам, осложнениям течения беременности и родов, формированию пороков развития плода.
4. **Инфицированию ребёнка** (возможно на любом этапе беременности, зависит от того, когда мама встретилась с инфекцией). Это приводит к проблемам с его здоровьем: низкой массе тела при рождении или недоношенности, конъюнктивиту, сепсису, а иногда — врождённым аномалиям и даже гибели.
5. **Поражению других органов** (суставов, печени, глаз и др., в зависимости от возбудителя).

Индивидуальная (личная) профилактика

1. Соблюдение **правил безопасного сексуального поведения**, к которым относятся:
 - отказ от раннего начала половой жизни,
 - исключение случайных половых связей,
 - сокращение числа половых партнёров и выбор одного наиболее надёжного,
 - использование средств индивидуальной профилактики ИППП,
 - в случаях подозрения на ИППП, случайном половом контакте с сомнительным партнёром, изнасиловании незамедлительно обращаться в специализированное лечебное учреждение.
2. **Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) и вируса гепатита В.**