



ООО "Арсенал МС" напоминает о предстоящем сезоне активности клещей и рекомендует пройти вакцинацию!

Активность клещей наступает с марта месяца и заканчивается с наступлением морозов. Первый пик активности приходится на май - июнь, второй на август-сентябрь, но укусы клещей возможны уже сейчас.

Для человека они опасны тем, что переносят вирусы и инфекции такие как: боррелиоз и клещевой энцефалит, которые могут привести к инвалидности, а иногда и к летальному исходу.

Инкубационный период длится 7-14 дней. Болезнь начинается остро и сопровождается резким подъемом температуры, ознобом, головной болью, слабостью, тошнотой, рвотой болью в суставах, слабостью, нарушением сна и раздражительностью. Так же беспокоят боли в области шеи и крестово-поясничном отделе.

Как снять клеща?

В случае укуса необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если такой возможности нет, то прежде чем вытаскивать клеща, вымойте руки и наденьте перчатки (или же можно обмотать пальцы бинтом). Используйте пинцет, клеща необходимо захватить как можно ближе к хоботку. Затем его аккуратно вытаскивают, вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если клеща попробовать выдернуть – велика вероятность его разрыва.

После того как вы сняли клеща, продезинфицируйте место укуса. Можно использовать йод, спиртовой раствор или перекись водорода. Осмотрите место укуса. Если осталась черная точка (произошел отрыв головки или хоботка), то с помощью стерильной иглы удалите ее так же, как и обычную занозу.

Выбрасывать или смывать клеща в раковину или унитаз ни в коем случае нельзя, они крайне живучи. В течение двух суток живого клеща в герметичной емкости рекомендуется сдать в лабораторию для исследования.

Внимание! При присасывании клеща необходимо обратиться к врачу, даже в случае благополучного удаления клеща с тела!

Как уберечься от укуса клеща:

- Отправляясь на природу во время активности клещей, необходимо надевать специальную одежду. При отсутствии специального костюма постарайтесь защитить себя от нападения клещей: наденьте светлую и однотонную одежду, с длинными рукавами на манжете, которые будут плотно прилегать к запястью, верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки;

надевая брюки заправьте их в носки или сапоги; обувь должна полностью закрывать стопу и лодыжку.

- Используйте отпугивающие средства (репелленты), которыми обработайте одежду тонким слоем.
- Не садитесь и не ложитесь на траву, старайтесь держаться середины тропинок, остерегайтесь высокой травы и кустарников.
- Если берёте с собой животных, после прогулки регулярно осматривайте их.
- Каждые 15-30 минут внимательно осматривайте себя и одежду.
- Не заносите в помещение из леса сорванные цветы, ветки и растения.

Самое главное - сделайте прививку!

- ✓ Вакцинация самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Бесплатно сделать прививку можно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления. Прививкам против клещевого энцефалита подлежат население, проживающее на неблагополучных по клещевому энцефалиту территориях, а также прибывшие на эти территории лица; лица, выполняющие сельскохозяйственные, заготовительные, геологические, изыскательные, экспедиционные работы, работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона активности клещей в течение 2 недель после прививки следует оберегаться от посещения природного очага. Активная профилактика клещевого энцефалита проводится детям с 3-летнего возраста, подросткам и взрослым до 70 лет. Существует три схемы вакцинации от клещевого энцефалита. Схема профилактической вакцинации детей и взрослых одинакова вне зависимости от возраста начала иммунизации.
1. Плановая вакцинация: две дозы вакцины с интервалом не менее 1 месяца (обычно 2–7 месяцев). Оптимальное время для начала вакцинации — осень, вторая доза вводится до начала таяния снега (февраль-март)
 2. Для весеннего периода оптимальный интервал между 1 и 2 дозой 1 месяц, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидемиологического сезона, который в Крыму начинается достаточно рано. Ревакцинация: первая через год, дальнейшая - каждые 3 года после первой ревакцинация.
 3. Ускоренная вакцинация: две дозы вакцины, вторая доза вводится не ранее чем на 14 день после первой. В любое время года.

Если Вы застрахованы в ООО «Арсенал МС» и у Вас есть вопросы об оказании бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС обращайтесь по телефонам:

☎8 (800) 700-07-76 (бесплатно по России),

☎+7 (978) 0-333-333 (для Республики Крым),

☎+7 (978) 0-777-777 (для города Севастополя).

Пожалуйста, поставьте ♥ , если эта информация была полезной для Вас?