

КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ



Клещевой боррелиоз – природно-очаговое заболевание, трансмиссивного типа. Возбудитель – боррелия, семейства спирохет.

Заражение происходит только через укус клеща (иксодовый клещ) или при раздавливании его пальцами.

Инкубационный период чаще 5-10 дней, максимально до 30 суток. Различают несколько стадий развития заболевания.

Первая стадия: отмечаются проявления в виде кожной и общеинфекционной симптоматики. Длительность – неделя. Отмечается острый синдром интоксикации. Характерный для инфекционного процесса: головная боль, озноб, тошнота, лихорадка, слабость, сонливость. Возникают боли в суставах, мышцах.

Эритема, возникающая в месте укуса клеща, является главным клиническим проявлением боррелиоза. Наблюдается постепенное увеличение красноты вдоль периферии (размеры от 1-10см до 60см и более). Эритема на ощупь болезненная. Форма – овальная. Часто центр эритемы характеризуется просветлением. Длительность эритемы сохраняется до 2-3 недель. Без лечения – 2-3 мес.

Вторая стадия заключается в диссеминировании инфекции из первичного очага (2-4 недели от начала заболевания). Вторая стадия характеризуется развитием осложнений кардиального и неврологического масштаба. Длительность второй стадии 1-6 недель.

Со стороны нервной системы отмечаются умеренные симптомы серозного менингита и энцефалита. Могут поражаться черепно-мозговые нервы с проявлением парезов мышц лица.

Поражение сердечно - сосудистой системы проявляется болями в области сердца, аритмией, развитием миокардита и перикардита.

Третья стадия развивается через 2 месяца от начала заболевания. Отмечается поражение крупных суставов (чаще коленные). Течение болезни - хроническое с развитием деструкций хряща и кости.

Лечение боррелиоза проводится только в условиях стационара.

Профилактика.

Специфическая профилактика боррелиоза в настоящее время отсутствует. На прогулках в лесу необходимо надевать защитную одежду, нанести средства, отпугивающие насекомых.

Если клещ прикрепился на кожу, его надо аккуратно удалить с помощью пинцета выкручивающими движениями за головку.

Необходимо как можно раньше обратиться к врачу для назначения медикаментозной профилактики, заключающейся в проведении антибактериальной терапии.